

SV - Dispenser D2 je aparat za kletanje rengingromedoni sm ineholder isoproprilalkohol (t.e.k. Caviwipes 17%). S gjenom holumentem ti palfingsaparatur og bevg kulturni og ihalu ihalume 10 sekunde 17 sekunde holumentem. Byt kulturni ved behor, nar det er tilmustet.

- For fjerre rester for holumentem, baster du 30 sekunde med en baste med kolt ester og en tambofere. Forleng endene overflaten til, til det ikke finnes flusker i mer.

- Puss alle overflaten i palfingsaparatur til ganger med en ren, lufit kul som er fuktet med rent vann, slik at rester er rengingsmiddel fjernes. Bruk fuktet kul med bevegelse.

MANUELL DESINFESKON

- Bruk en ren, lufitt kul som er fuktet med et desinfeksjonsmiddel med isoproprilalkohol (t.e.k. Caviwipes 17%). Slik at overflaten og hullene til lufit dispenser blir fuktet slik i minst fem minutter. Bruk ekstra kul, for å sikre at overflaten og hullene forlenger oppover under kontakt på fem minutter.

- For fjerre rester bruk holumentem, baster du 30 sekunde med isoproprilalkohol, slik at overflaten og hullene til beholder og dispenser tørkes av til ganger for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel. Bruk flere kulter ved behov.

TØRKE

La kulhollen og palfingsaparaturen stå, til man ser det er tørt.

REPARASJON, INSPEKSJON OG KONTROLL

Inspeksjon dispenserens og kulhen med normal belysning:

- Hvis dispenser og kulhø som synlige skader eller tilfelle må byttes ut.

- Manuell rengjøring og inspeksjon må gjentas hvis dispenser eller kulhø ikke er synlig rene.

PAKKE INN

Sett sammen palfings-apparatet og kulhøen igjen.

STERILISERING

Dispenser er ikke-sterile medisinprodukter. En sterilisering er ikke nødvendig.

GARANTI

SV Dental Supply GmbH garanterer at dette produktet er fri for material- og produksjonsfeil. DS Dental Supply GmbH påtar seg ikke, for eller uten garanti for solgførlighet eller apparatet egnert seg for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at produktet brukes riktig. Hvis det oppstår skader på produktet i løpet av garanti perioden, er det eneste kravet da har og DS Dental Supply GmbHs eneste forpliktelse å foreta reparasjon eller å erstatte produktet med et likt produkt av samme kvalitet.

ANSVARSBEGRENSNING

Såfremt loven om ansvarsbegrensningen tillater det, har DS Dental Supply GmbH ikke ansvar for tap av skader som oppstår ved bruk av dette produktet, enten det gjelder handlinger som er utført direkte, indirekte, spesielt, følgeakader og uansett om de er resultatet grunnlagit inkulsive garantier, kontrakt, forsumselse eller ulykke.

OPPREPÅRE TILGJENGELIG FOR BARN!

KUN MEINT BRUKT INNEN TILNÆPPE

SV - Dispenser D2

BRUKSANVISNING

Til den smula spsk (nr. 1/17) på baksliden av doseringsetten Dispenser D2 ogutt av da tillaks side (nr. 1/12) helt og hållet. Fall ut plastplassen (nr. 1/27) och sät i plastplassen (nr. 1/22). Da av patronens foringsapparat (nr. 1/3) genom att låta moturs med 90° och kassera den. Sätt på en blandningsnagel (nr. 1/41). Se till att utspargningen på blandningsnageln och på patronen stämmer överens med varandra. Läst fast att utspargningen genomgår ett enda led och inte genom två led (nr. 1/41).

Blanda materialet i blandningsnageln genom att aktivere spsk (nr. 1/5) på Dispenser D2 och applicera om edelbart.

Ta bort patronen. Spsk (nr. 2/71) ogutt av da tillaks side (nr. 2/12) helt och hållet. Fall upp plastpansen (nr. 2/21) och tätt patronen (nr. 2/22).

Föråra patronen med den använda blandningskapseln som förstärkning.

Rekonditioneringsanvisning enligt EN ISO 17664-2017

AVSEED ANVÄNDNING

Byggt av en avsedd användare, handhållen eller är avsedd för intra- eller extraoral (t.ex. på en trycksid) användare av komponenter: dentalmaterialer (t.ex. fyllningsmaterial, apparat, dentalcement) från en patron. Detta är en återanvändningsanvisning.

INDIKATIONER

Indikator för behandling med dentalmaterial som elastomer materialer för artkyr och dentalcement för provisoriska restaureringar.

KONTRANDIKATIONER

Indikator för kontraindikationer: ingen. Ingen kontraindikasjon.

ALLMÄN INFORMATION

Denna doseringssett levereras ike-steril.

REKONDITIONERING

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- En doseringssett som har synliga skader eller tillfelle må bytas ut.

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transporteras till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas omedelbart efter användningen.

- Den kontaminerade doseringssetten ska transportas till rengöringsområdet (en ren och sluten låda behåller som förhindrar en spridning av kontaminering).

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

REKONDITIONERINGSPROSEDUR

- Slutt på brukslängden för en återanvändningsdoseringsett avgörs i regel genom tillagte och bruks-referensladd.

Indikator för rengjøring av brukslängden har passert; när acceptabla försöringssat har passert, misfärgning spjckor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄRTERTAGEN PÅ ANVÄNDNINGSSÄTTET

- För att förhindra att en eventuell kontaminering tarer in, rekommenderas att rekonditioneringen genomtas o